

Tableau 2. Score clinique de probabilité du diagnostic de TIH [3].

Diminution du chiffre plaquettaire ou thrombopénie			
- Diminution > 50 % OU plaquettes entre 20-100 G/L			Score = 2
- Diminution de 30 à 50 % OU plaquettes entre 10-19 G/L			Score = 1
- Diminution < 30 % OU plaquettes < 10 G/L			Score = 0
Chronologie de la diminution des plaquettes			
- apparition entre 5 ^e et 10 ^e jour ou < 1 j si exposition précédente à l'héparine (< 100 j)			Score = 2
- chronologie compatible mais non certaine ou diminution après 10 ^e jour			Score = 1
- thrombopénie précoce sans exposition récente à l'héparine			Score = 0
Thrombose et/ou lésions cutanées			
- Nouvelle thrombose ; nécrose cutanée ; réaction systémique après bolus d'héparine			Score = 2
- Thrombose suspectée non prouvée ; lésions cutanées érythémateuses			Score = 1
- Aucune			Score = 0
Autres causes de thrombopénie			
- Aucune cause de thrombopénie mise en évidence			Score = 2
- Autres causes possibles			Score = 1
- Autre cause connue			Score = 0
Probabilité clinique de TIH	Forte	Moyenne	Faible
Score total	6-8	4-5	0-3